Trajadura Vass7R01s441-445

Collection Vassal-Montpellier

1424Mtp2

Trajadura 10 R8 s - 576 - 580



dantadantadantadantad



dantadantadantadantad



dantadantadantadantad

dontodontodontodontod







	NOM EMPLACEMENT NO Rg 8 1576-580 Trajadura 142402													
Souche	Nbre yeux	Débou	rrement mi/déb	Nbre grap	Ferti-	erti- Floraison ité début mi/f fin			Véraison début mi/v fin		fin	Maturité		
1 2			29.3°		8	29,5	4.6	7,6	1-8	5.8	13.8	2-9		
3 4 5	TOTAL STREET		26.3° 29.3°		Grappe: G - M - P Dim : / Compacité: L - M- C Pour : O Mill : O Baie: TG - G - W - P Dim: /6 X / S diag arb (1) and be a long of the compacitie : L - M- C									
		le.26.	3.91		disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur: B-Gr-Rs-Rg-N Jus: inc - coloré Saveur: S - m - ar - fox - herb Pépins: avec - apyrène Port: Lenge Vigueur: 4 La stat rose baie. 2913									

	JEE 1	992						. 0				gallega
NOM 142		Tray	adura:	= Treis	EMPLAC	EMENT	No.	R8s	576.	. 580	4	
Souche	Nbre yeux	Débou début	rrement mi/déb	Nbre grap	Ferti- lité	Flo:	raison mi/f	fin	Vé: début	raison mi/v	fin	Maturité
1	6	26.3	2.4	2	4	18.5.	21.5	26.5	24.7	307	4.8	7,9
2	3	193	2334	2			_1			+1		+4
3	f				Grappe	: G -	м - (Р)Dim	: 11	Compa	cité	L-MfC
4	2	30,3	2,4	1	Pour :	2	Mil	1 : 6)			: L - M (C)
5	2	30.3	2.4	1	Baie :							
		2.4 · +13			Couleu Saveur Pépins Port :	r : (B)-(: (S) - : ave	Gr-Rs- $m-a$ $c-ap$	Rg-N r - fo yrène	ox - he	: inc	- cc	oloré

ANNEE: 1993 (21)

NOM Trajadura

St. 10.86. 142402

EMPLACEMENT 10 R8 a - 576.580

NOTICABL	Nbre yeux		rrement mi/déb		Ferti- lité		raison mi/f			raison mi/v		Maturité
1 2	6	22.3	1-4-	46	12	245	29.5	3.6	3,8	9,8	17,8	13,9
5 3	3		5.4° 5,4°	4 5	Pour : Baie : Couleu Saveur	TG - 0 disc-s r : B-0 r : s -	Mil G - M ph-ell Gr-Rs- m - a	1 : - P : -ov-o Rg-N r - f yrène	Dim: bov-cy: <u>Jus</u> ox - he	l-fus : inc		: L - M-C

N° d'ordre :

Désignation : Emplacement : 10 R\$ 0- 576-580 0.1 Trajadura

(A) BOURGEONNEMENT

Epanoui 182 - moyen 183 - globuleux 184.

Glabre 185 - séteux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 - cotonneux 190 - sans villosité pubescente 278 - sans villosité laineuse 279.

Blanc 191 - fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 - jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzé ou cuivré 197 - vert 198 blanclif

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Etalées - en gouttière - autres.

Face inférieure: glabres 199 - séteuses 200 - veloutées 201 - aranéeuses 202 - duveteuses 203 - cotonneuses 204 - sans villosité pubescente 200 - sans villosité laineuse 281.

Face supérieure : blanches 205 fauves ou rousses 206 - carminées 207 - à liséré carminé 208 - jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées 210 - entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 212 - autres 213.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée).

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Face inférieure

Nervures: glabre 214 - séteux 215 - velouté 216 - aranéeux 217 - duveteux 218 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282 - sans villosité laineuse 283.

Limbe: glabre 220 - séteux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 - duveteux 224 - cotonneux 225 - sans villosité pubescente 284 - sans villosité laineuse 285.

A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 - jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - verte 233.

A pétiole glabre 234 - séteux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 - duveteux 238 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans villosité laineuse 287.

Totalement - sillon - partiellement.

Calvo 90

N° d'ordre :

Désignation : Emplacement :

Trajadura 10R8 s.576-580A:1

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - côtelé. Glabre 242 - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 séteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241. sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289. Entièrement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies 249 - vert 250) - he light whites

ventre coloré 251 - à raies 252 - vert 253.

: dos coloré 254 - à raies 255 - vert 256, Noeuds

ventre coloré 257 - à raies 258 - vert 259.

: verte 260 - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge foncé 263. Vrille

subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - moyenne - longue - très longue.

: coloré 264 - vert 265) Bourgeon

(I) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit. Morphologiquement : mâle 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

Calvogo

N° d'ordre :

Désignation :

Trajadura 10 R8 576-580s.1

Emplacement :

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142 - grande 143.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - séteux - velouté aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - séteux 145 - velouté 146 aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 sans villosité pubescente 272 - sans villosité laineuse 273.

limbe : glabre 150 - séteux 151 - velouté 152 aranéeux 153 duveteux 154 - cotonneux 155 sans villosité pubescente 274) - sans villosité laineuse 275.

Limbe: plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté. Lobes : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface: unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyennement bullée 162 - grossièrement bullée 159 - gauffrée 160 plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 partiellement rouge 165 - entièrement rouge 166.

> Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 -'entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

PETIOLE

Long 170 - moyen 171 - court 172. Glabre 173 - séteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 sillon - partiellement - totalement. Coloré 176 - partiellement coloré 1(77) - vert 178. Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277. partiellement - totalement.

Calvo 89

N° d'ordre :

Trajadura 10 R8 o. 576-580 p. 1

Désignation : Emplacement :

GRAPPE

Grosse 68 - Moyenne 69 - Petite 70 (dimensions 14x). Lâche 71 - Moyenne 72 - Compacte 73.

A pédoncule non visible 74 - visible 75 - long 76.

A pédoncule herbacé 77 - mi-aoûté 78 - aoûté jusqu'à la première ramification 79.

Axe de la rafle coloré 80 - non coloré 81.

Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne 84 - Petite 85 - Très petite 86 de taille régulière - irrégulière (dimensions 20 x 48). De couleur blanc 87 - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 91. Très pruinée 92 - pruinée 93 - non pruinée 94.

Coloration régulière - irrégulière. Forme : discoïde 95 - sphéroïde 96 - ellipsoïde 97 - ovoïde 98 troncovoïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104.

A jus incolore 105 / coloré 106.

A ombilic très apparent - peu apparent.

A section transversale : régulière 107 - irrégulière 108 - côtelée 109.

Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée 111.

A saveur neutre 112 - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 herbacée 117 - spéciale 118.

De séparation facile (égreneuse) - difficile.

A pédicelle long 119 - moyen 120 - court 121.

A pédicelle de couleur : verte 122 - rouge 123 - irrégulière 124.

A bourrelet de couleur verte 125 + rouge 126 - irrégulière 127.

A bourrelet évident 128 - peu apparent 129.

A pinceau : court 130 - moyen 131 - long 132.

A pinceau : coloré 133 - non coloré 134.

A peau fine 135 - moyenne (36) - épaisse 137.

A pulpe charnue 138 - juteuse 139)- molle 140 - peu juteuse.

Aved pépins - apyrène.

Calvo 90

DENOMINATION :

4

Trajadura 10 R80-576-580A.1

EMPLACEMENT :

SARMENT DE VIGNE

: long (1) - moyen (2) - court (3) : grêle (1) - moyen (2) - fort (3) : ramifié (1) - peu ramifié (2). Sarment

: adhérente avec lenticelles (1) - résistante se Ecorce

détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) autre (4).

unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).
pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -Surface

duveteux (8) -cotonneux (9).

: entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

: aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4). Noeuds

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4)

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron fonce (5) - brun rouge (6) violacé (7) - autre (8).

: pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3). Yeux : marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2) : saillant (1) - efface(2)

: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) - rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvogo

N° d'ordre: 1424.02 Désignation: Trajadura Emplacement: 10 281576-580

Angle des nervures : 4 - 5 - (6) Sexe : (7)-8-9 L1/L : 10 - (11) L2/L : 12 - (13) - 14 - 15 - 16 Nombre de lobes : 17 - (18) - 19 - 20 Prof. sinus latéral Sup. : (21) - 22 - 23 - 24 Prof. sinus latéral Inf. : 25 - 26 - 27 - 28 - 29 Forme sinus pétiolaire Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266 : (267) Sinus pétiolaire ouvert Dent au fond du sinus pétiolaire : 30 Forme sinus latéral Sup. 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270 : (271) Sinus latéral Supérieur ouvert : (40) - 41 Dents : forme : 42 - (43) - (44) Dents (angle) : 45 - (46) - (47) Angle du lobe terminal Sinus pét. (dégar. - gar. -1/2 dégar.): 48 - 49 - 50 Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58- 59 : 60 - 61 - 62 : 63 - 64 - 65 - 66 - 67 Angle des nervures L3 L'3 Largeur du sinus pétiolaire

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Rennes 92